



Recomendaciones para la conexión entre las unidades de coordinación de fracturas osteoporóticas y Atención Primaria

Ref. O-014
40º CONGRESO
SEMI

Barcelona
27, 28 y 29
Noviembre
2019

Autores: María José Montoya¹, Francisco Jesús Olmo¹, Bartolomé Lladó², Soledad Ojeda³, Mercedes Giner¹, Monica Balcells-Oliver⁴, Laura Canals⁴


1. Servicio de Medicina interna, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla; 2. Servicio de Medicina interna, Hospital Son Llàtzer, Palma de Mallorca, Mallorca; 3. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria; 4. Amgen, Barcelona.

OBJETIVO

- Establecer recomendaciones para promover la coordinación entre la unidad de coordinación de fracturas (FLS) y Atención Primaria (AP) para garantizar la continuidad asistencial del paciente con fractura por fragilidad.

MATERIAL Y MÉTODOS

- 1 • Selección de siete áreas de salud españolas




- 2 • Grupo de trabajo multidisciplinar



- 3 • Discusión conjunta para definir las principales recomendaciones para la coordinación FLS-AP y los indicadores de calidad de su implantación

RESULTADOS

- Recomendaciones para la coordinación FLS-AP:
- Indicadores de calidad de la coordinación FLS-AP:



DISCUSIÓN

- Una coordinación FLS-AP efectiva es necesaria para el manejo de la osteoporosis a largo plazo, dado el papel fundamental de AP en el seguimiento de los pacientes. Las recomendaciones e indicadores propuestos permitirán mejorar la coordinación FLS-AP y optimizar el seguimiento de los pacientes con fractura.

CONCLUSIONES

- La aplicación de las recomendaciones para la mejora de la coordinación FLS-AP podrá contribuir a la prevención de nuevas fracturas osteoporóticas. La comparación de los resultados por centros permitirá identificar y establecer estrategias de mejora

REFERENCIAS

1. Harvey NCW. *Osteoporos Int.* 2017;28(5):1507-29
2. Vaculik J. *Arch Osteoporos.* 2017;12:(1)49.

